



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

イ ス ク ラ せい えい か りゅう
イスクラ清宮顆粒

(瀉下薬)

■特徴

「イスクラ清宮顆粒」は、ジオウ、シャクヤク、オウゴン、ダイオウ、ボタンビ及びサンシシの6種類の植物性生薬より抽出したエキスを顆粒としたものです。便秘又は便秘に伴う、頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔の症状の緩和を目的としております。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

※裏面もお読みください。

■効能・効果

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

■用法・用量

次の量を、1日3回、食前又は食間あるいは食後に服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1/2~1包	3回
15歳未満11歳以上	1/3~2/3包	
11歳未満7歳以上	1/4~1/2包	
7歳未満3歳以上	1/6~1/3包	
3歳未満	服用しないでください。	

●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は、3歳未満の乳幼児には服用させないでください。

■成分・分量

本品1日量3包(6g)中

ジオウエキス	1.32g
(原生薬換算量：ジオウ)	3g
シャクヤク軟エキス	1.40g
(原生薬換算量：シャクヤク)	2g
オウゴンエキス	1.08g
(原生薬換算量：オウゴン)	3g
ダイオウエキス	0.40g
(原生薬換算量：ダイオウ)	2g
ボタンビエキス	0.66g
(原生薬換算量：ボタンビ)	3g
サンシシエキス	0.16g
(原生薬換算量：サンシシ)	0.75g

※添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

イスクラ産業株式会社
東京都中央区日本橋1-14-2
URL: <http://www.iskra.co.jp/>

16DW02